الحملة الطارئة للتطعيم
ضد مرض شلل الأطفال
في قطاع غزة

أسئلة و أجوبة عن شلل الاطفال

وزارة الصحة الفلسطينية

يونيسف
لكل طفل

unrwa
الاونروا

منظمة الصحة العالمية
الأرض الفلسطينية المحتلة

أسئلة و أجوبة عن شلل الاطفال

الأهالي الأعزاء يتم إعطاء الطفل نقطتين بالفم من طعم شلل الاطفال في المرة الأولى، يعاد التطعيم في المرة الثانية بعد أربعة أسابيع.

بالتطعيم ضد شلل الأطفال نحمي أطفالنا من الإصابة بهذا المرض الخطير.

س1: ما هو شلل الأطفال؟

ج1: شلل الأطفال، هو مرض فيروسي معد، تتراوح شدته من عدوى بسيطة إلى مرض يصحبه شلل رخوي في الأطراف خصوصاً السفلى من الجسم. قد يصيب مرض شلل الأطفال جميع الفئات العمرية وبشكل رئيسي الأطفال دون 5 سنوات.
فيروس شلل الأطفال هو فيروس معوي بشري يغزو الجهاز العصبي وهو من فصيلة الفيروسات البيكورناوية (Picornaviridae)

س2: كيف ينتقل شلل الأطفال؟

ج2: ينتقل مرض شلل الأطفال من شخص مصاب إلى آخر سليم عبر عدة طرق منها البراز الملوث أو طعام و ماء ملوثين أواستخدام أدوات ملوثة بالفيروس. يدخل الفيروس الجسم عبر الفم ثم يتكاثر في الحلق و الأمعاء و ينتقل عبر الدم إلى باقي أجزاء الجسم و في العادة فإن فترة حضانة الفايروس تكون فى المتوسط من أسبوع – إلى أسبوعين و قد تمتد ما بين 30 – 35 يوم.

س3: ما هي أعراض شلل الأطفال؟

ج3: 1) بدون أعراض: ويمثل ما نسبته 90-95 %.

2) أعراض طفيفة وتمثل ما نسبته 4-8 % وتشمل التهاب في الحلق، قيء، مغص وفي حالات نادرة إسهال.

3) التهاب السحايا العقيم: يمثل ما نسبته 1-2 % ويعاني المريض من الصداع وألم أو تصلب في الرقبة، مع حمى وقيء.

4) إلتهاب النخاع الشللي: ونسبته من 1.5-1 %.

5) تؤدي حالة من أصل 200 حالة عدوى بالمرض إلى شلل عضال (يصيب الساقين عادةٌ) ويلاقي ما يتراوح بين 5% و 10% من المصابين بالشلل حتفهم بسبب توقف عضلاتهم التنفسية عن أداء وظيفتها.

س4: لماذا الحديث عن شلل الأطفال حالياً في قطاع غزة؟

ج4: بعد فحص عينات بيئية من المياه العادمة في خانيونس (موجب 3 من 4 عينات) و دير البلح (موجب 3 من 3 عينات)، تبين وجود فيروس شلل الأطفال في هذه العينات، و بناء على ذلك أعلنت وزارة الصحة الحملة الطارئة للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال في قطاع غزة.

س5: ما هي العوامل التي تزيد من خطورة هذا الفيروس؟

ج5: تزداد فرص انتشار هذا الفيروس بسبب ظروف الحرب من النزوح الجماعي والاكتظاظ، انهيار البنية التحتية للصرف الصحي وشح الموارد اللازمة للحفاظ على النظافة الشخصية والعامة.

س6: هل هناك علاج لمرض شلل الأطفال وكيف يمكننا حماية أطفالنا من هذا المرض؟

ج6: التطعيم هو الحل الوحيد والفعال للوقاية من شلل الأطفال حيث لا يوجد علاج في حال الاصابة بالمرض.

تطعيم شلل الأطفال

س7: كيف تتم عملية التطعيم ضد شلل الأطفال في هذه الحملة؟

ج7: سيتم إعطاء كل طفل تحت سن العشر سنوات نقطتين من اللقاح على مرحلتين مختلفتين يفصلهما أربعة أسابيع وسيتم إعطاء النوع الفموي من هذا اللقاح بواقع نقطتين بالفم كل مرة.

س8: من هي الفئة المستهدفة من حملة التطعيم الحالية؟

ج8: هذه الحملة تستهدف جميع الأطفال دون سن العاشرة (مواليد الأول من أغسطس 2014 فما بعد).

س9: هل لقاح شلل الأطفال آمن لطفلي؟

ج9: نعم، لقاح شلل الأطفال آمن وتم استخدامه في جميع أنحاء العالم لسنوات عديدة، بما في ذلك الأطفال المرضى وحديثي الولاده. يظل لقاح شلل الأطفال هو الوسيلة الأفضل والأكثر أمانًا وفعالية لتحصين الطفل ضد شلل الأطفال.

س10: هل هناك أي آثار جانبية للقاح شلل الأطفال؟

ج10: لقاح شلل الأطفال آمن جدًا. معظم الأطفال لا يعانون من أي آثار جانبية. إذا حدثت آثار جانبية، فإنها عادة ما تكون خفيفة.

أهمية تطعيم شلل الأطفال

س11: لماذا من المهم تطعيم طفلي ضد شلل الأطفال؟

ج11: لا يوجد علاج في حال الاصابة بمرض شلل الأطفال. ولكن الحصول على اللقاح هو الحل الوحيد والفعال للوقاية.

س12: لقد حصل جميع أطفالي على تطعيم ضد شلل الأطفال سابقاً، هل يجب علي أن أعطيهم التطعيم مره أخرى؟

ج12: نعم، يمكـن الوقايـة من مرض شلل الأطفال بإعطـاء الأطفال لقـاح شـلل الأطفال والـذي يعطـى علـى دفعـات متعـددة ويمكنه أن يقي الطفل من شر المرض مدى الحياة .

س13: هل يمكن للبالغين الإصابة بشلل الأطفال؟

ج13: بينما يؤثر شلل الأطفال بشكل رئيسى على الأطفال دون سن الخامسة ، يمكن للبالغين أيضًا الإصابة بالعدوى اذا لم يكونو قد تلقوا اللقاح ضد مرض شلل الأطفال مسبقا. يساعد التطعيم في منع انتشار الفيروس إلى جميع الفئات العمرية.

س14: ماذا يجب أن أفعل للوقاية من مرض شلل الأطفال في منطقتنا؟

ج14: تأكد من أن جميع أطفالك تحت سن العاشرة قد تلقوا جرعة التطعيم ضمن الحملة الحالية في مرحلتيها الأولى والثانية. حافظ على تطعيم أطفالك، حافظ على النظافة الشخصية بالوسائل المتاحة ، وانشر الوعي بأهمية تلقي اللقاح ضد شلل الأطفال بين الأصدقاء والعائلة.

س15: ماذا سيحدث اذا لم يتم تطعيم جميع الأطفال خلال الحملات؟

ج15: اذا لم يتم تطعيم كل طفل خلال الحملات الوطنية، فإن مرض شلل الأطفال سينتشر بشكل أسرع ويصيب المزيد من الأطفال.حيث أن طفلا واحدا غير محصن من المرض، قد يعرض بقية الأطفال للخطر ويهدد صحتهم ومستقبلهم، لذا دعونا نحمي جميع الأطفال من خلال تطعيم كل طفل.

س16: ماذا لو كان لدي المزيد من الأسئلة أو المخاوف حول تطعيم شلل الأطفال؟

ج16: يمكنك التواصل مع مقدمي الرعاية الصحية، العاملين الصحيين المجتمعيين، أو وزارة الصحة. يمكنهم تزويدك بمعلومات موثوقة ومعالجة أي مخاوف قد تكون لديك.

س17: ماذا يتم فعله للسيطرة على تفشي شلل الأطفال في غزة؟

ج17: تقوم وزارة الصحة بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية و الانروا و اليونيسف بتنفيذ حملات تطعيم، و زيادة الوعي، وتوفير معلومات دقيقة للمجتمع. كما يقومون بتدريب العاملين الصحيين لضمان استجابة فعالة وتغطية تطعيم شاملة.

هل لديكم أسئلة او تريدون الإبـلاغ عن أي مشكـلة بخصوص حملة التطعيم الطارئة ضد شلل الأطفـال؟ يمكنكم الاتصال على الخط المجاني 126-124-1800 (8 صباحا حتى 8 مسـاء) أو مراسلتنـا على البريـد الإلكتروني sop_report@unicef.org

لمزيد من المعلومات:

عبر الإنترنت:

من أوريدو:

من جوال: